

TIPS VOOR HET SUCCESVOL INZAAIEN VAN GRASKRUIDENSTROKEN, BLOEMENSTROKEN EN VOEDSELGEWASSEN

Tips bij de aanleg van graskruidenstroken

Wanneer inzaaien?

- **Gemengde grasstrook (plus):** in de nazomer (voorafgaand aan de start van de beheerovereenkomst) of rond half april
- **Bloemenstrook:** in de tweede helft van april, wanneer de bodem voldoende is opgewarmd



Gemengde grasstrook plus (© Pieter Verdonckt)

Hoe stel ik een goed graskruidenmengsel samen?

- Stel aan de hand van de soortenlijst toegevoegd bij uw beheerovereenkomst een zaadmengsel samen bestaande uit:
 - 85 % grassen, minstens drie soorten waaronder minstens twee soorten aangeduid met *
 - 15 % kruiden, bestaande uit:
 - vlinderbloemigen, minstens 1 soort en tussen 2 % en 5 % gewichtsaandeel in het mengsel
 - een- of tweejarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5 % en 10 % gewichtsaandeel in het mengsel
 - meerjarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5 % en 10 % gewichtsaandeel in het mengsel
- Zaaihoeveelheid: maximum 15 kg/ha

Hoe stel ik een goed bloemenmengsel samen?

- **Eenjarige mengsels** (jaarlijks in te zaaien):
 - Tübingermengsel op zwaardere gronden: phacelia, boekweit, gele mosterd, bladrammenas, koriander, goudsbloem, groot kaasjeskruid, juffertje-in't-groen, korenbloem, dille, bernagie
 - Brandenburgermengsel op lichtere gronden: phacelia, boekweit, gele mosterd, bladrammenas, groot kaasjeskruid, korenbloem, dille, bernagie, gele ganzenbloem, grote klapproos, serradelle, zonnebloem
- Zaaihoeveelheid: maximum 10 kg/ha



Houd de factuur en het zaaizaadetiket met vermelding van soorten (en %) altijd bij.

• **Klavermengsel:**

Klavermengsel (opnieuw in te zaaien in het derde jaar)			
Nederlandse benaming	Wetenschappelijke benaming	Maximaal % op totaal gewicht	Zaai-hoeveelheid
witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	20	max. 20 kg/ha
rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	5	
luzerne	<i>Medicago sativa</i>	50	
incarnaatklaver	<i>Trifolium incarnatum</i>	15	
esparcette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	10	
gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	15	

- Leg bij inzaai in het voorjaar en/of op percelen met grote onkruiddruk een **vals zaaibed** aan. Hierbij wordt de strook minstens twee weken voor de inzaai van het mengsel zaaiklaar gelegd. Het inzaaien gebeurt dan na een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter) die het aanwezige of kiemende onkruid bestrijdt zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen. Zaai het zaad zo oppervlakkig mogelijk in. Roer het zaaimengsel af en toe als er grotere oppervlaktes ingezaaid moeten worden. Dat voorkomt ontmenging van de zaden. Bij inzaai in droge omstandigheden of op lichte gronden wordt na het inzaaien best gerold om uitdroging van de oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen.

Tips bij het aanleggen van faunavoedselgewas

Wanneer inzaaien?


- Zaai jaarlijks een zaadleverend gewas(mengsel). Als het perceel binnen een beheergebied voor hamster ligt, zaai dan liefst zo snel mogelijk na 15 maart en bij voorkeur na een niet-kerende bodembewerking.
- Zaai zomergranen zoals rogge en haver best voor midden april in, en vorstgevoelige soorten zoals Japanse haver en bladrammenas best voor begin mei.

Hoe stel ik een goed zaadleverend gewasmengsel samen?

- Onderstaande bloeiende gewassen mogen bijgemengd worden in de vermelde maximale hoeveelheden:
 - Tübinger- of Brandenburgermengsel: 1 kg/ha of
 - Vlinderbloemigen: 2 kg/ha of
 - Vlas: 5 kg/ha of
 - Eén- of tweejarige kruiden: 2 kg/ha
- Gebruik indien nodig een **halmverkorter** om te voorkomen dat het gewas gemakkelijk neervalt.



Meerjarige bloemenstrook (© VLM) ↑



Bloemenstrook Tübinger (© Inagro) ↑
Faunavoedselgewas (© VLM) ↓



VLM Toon Derhyts, Geëdeleerd bestuurder, Vlaamse Landmaatschappij, Gulden-Vlieslaan 2, 1060 Brussel, juni 2017