



Vlaanderen
is open ruimte

FAUNAVOEDSELGEWAS WISSELTEELT

infofiche beheerovereenkomsten

WAT?

Een perceel faunavoedselgewas wisselteelt zaait u in met granen of andere zaadleverende gewassen in het eerste jaar, die u niet oogst. Na het eerste jaar zaait u de helft van het perceel beurtelings opnieuw in.

WAAROM?

- Faunavoedselgewas wisselteelt vergroot het voedselaanbod voor akkervogels, zowel in de winter als in de zomer. Daarmee stijgen de overlevingskansen van akkervogels, kunnen ze fitter het nieuwe broedseizoen starten en vinden ze voedsel voor hun jongen.
- De graanstoppels en de spontane opslag op het niet-ingezaaide deel bieden voedsel, schuilmogelijkheid en een broedveilig leefgebied akkervogels zoals patrijs en veldleeuwerik.
- In het nieuw ingezaaide deel kunnen bijvoorbeeld veldleeuweriken in het voorjaar veilig broeden.
- Faunavoedselgewas wisselteelt biedt ook voedsel en schuilmogelijkheden voor muizen. Die zijn een voedselbron voor roofvogels en uilen.

HOE?



Deel het perceel op in 2 gelijke delen of in stroken van minimaal 15m breed.



Zaai **jaarlijks** de helft van de oppervlakte opnieuw in.




Laat het gewas tot volgende inzaai staan.

Er zijn 2 opties voor faunavoedselgewas wisselteelt


1 zomergraan



- Zaai zodra het weer het toelaat, en uiterlijk voor 1 mei
- Bij slechte opkomst mag u voor 1 augustus het perceel opnieuw inzaaien met Japanse haver, varianten Pratex of Giraffe



2 wintergraan



€ 2053 euro/ha/jaar



TIPS

1 Een vals zaaibed aanleggen, helpt onkruiden onderdrukken. Een twee- tot drietal weken na het zaaiklaar leggen van het perceel kan u, in het geval onkruiden kiemen, het perceel oppervlakkig bewerken. Witte klaver onderzaaien kan ook een oplossing bieden. Afhankelijk van de voorkomende akkervogels in een gebied zijn andere zaadleverende gewassen aangewezen. Uw bedrijfsplanner zal dat met u bespreken.

2 Gebruik bij voorkeur onbehandeld zaaizaad, dus zonder een laagje met bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en dergelijke. U voorkomt zo dat akkervogels daarmee in contact komen. Dat is ook beter voor o.a. regenwormen en ander bodemleven.

3 Bij slechte opkomst mag u voor 1 augustus het perceel opnieuw inzaaien met Japanse haver, varianten Pratex of Giraffe.

! Hou rekening met volgende bepalingen:



U mag bemesten volgens de bemestingnormen.



- Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
- Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal ongewenste soorten mag wel.



Voer geen andere activiteiten uit op het perceel.



Lees welke zaadmengsels u moet gebruiken op vlm.be