

## INFOFICHE – FAUNAVOEDSELGEWAS WISSELTEELT

### Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming

#### WAT?

Een perceel faunavoedselgewas wisselteelt zaait u in met granen of andere zaadleverende gewassen in het eerste jaar, die u niet oogst. Na het eerste jaar zaait u de helft van het perceel beurtelings opnieuw in.

#### WAAROM?

- Faunavoedselgewas wisselteelt vergroot het voedselaanbod voor akkervogels, zowel in de winter als in de zomer. Daarmee stijgen de overlevingskansen van akkervogels, kunnen ze fitter het nieuwe broedseizoen starten en vinden ze voedsel voor hun jongen.
- In de graanstoppels en de spontane opslag vinden akkervogels zoals patrijs en veldleeuwerik voedsel, dekking en een veilig broedgebied.
- In zomer- en wintergraan kunnen bijvoorbeeld veldleeuweriken veilig broeden.
- Faunavoedselgewas wisselteelt biedt ook voedsel en dekking voor muizen. Die zijn een voedselbron voor roofvogels en uilen.

#### HOE?

Deel het perceel op in twee gelijke delen of in stroken van minstens 15 m breed waarbij de helft van de oppervlakte jaarlijks opnieuw wordt ingezaaid:

- **Optie 1.** Zaai een zomergraan (behalve maïs) of een ander zaadleverend mengsel of gewas in, zodra de weeromstandigheden het toelaten en uiterlijk voor 1 mei. Oogst het gewas niet en behoud het tot 15 maart.
  - ➔ deel 1: laat het gewas staan in het 2<sup>de</sup> jaar en zaai opnieuw in in het 3<sup>de</sup> jaar. Laat het gewas staan in het 4<sup>de</sup> jaar en zaai opnieuw in in het 5<sup>de</sup> jaar.
  - ➔ deel 2: zaai dit deel opnieuw in in het 2<sup>de</sup> jaar en laat het staan in het 3<sup>de</sup> jaar. Zaai het gewas opnieuw in in het 4<sup>de</sup> jaar en laatst het staan in het 5<sup>de</sup> jaar.
  - ➔ Klepelen mag tussen 15 augustus en 1 oktober in het jaar volgend op de inzaai
- **Optie 2.**
  - ➔ deel 1: zaai in in het 1<sup>ste</sup> jaar een zomergraan (behalve maïs) of een ander zaadleverend mengsel of gewas in voor 1 mei en zaai in het 2<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> jaar een wintergraan in voor 31 december. Laat het gewas staan tot de volgende inzaai. Klepelen mag vanaf 15 augustus van het 2<sup>de</sup> en het 4<sup>de</sup> jaar, voorafgaand aan de herinzaai.

- ➔ deel 2: zaai in het 1<sup>ste</sup> jaar een vlinderbloemige in voor 1 mei en een wintergraan voor 31 december. Laat het wintergraan staan. Klepelen mag vanaf 15 augustus in het 3<sup>de</sup> jaar, voorafgaand aan de herinzaai. Zaai in het 3<sup>de</sup> jaar een wintergraan in voor 31 december. Laat het gewas staan tot de volgende inzaai. Zaai in het 5<sup>de</sup> jaar een zomergraan in voor 1 mei.

## HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN

- Zaai altijd een mengsel in dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in de bijlage van de overeenkomst.
- Bemesting is toegestaan volgens de geldende wettelijke bemestingsnormen.
- Voer behalve het beheer geen enkele andere activiteiten uit op het perceel.
- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal soorten zoals akkerdistel mag wel.

## TIPS

- Een vals zaaibed aanleggen, helpt onkruiden onderdrukken. Een twee- tot drietal weken na het zaaiklaar leggen van het perceel kan u, in het geval onkruiden kiemen, het perceel oppervlakkig bewerken. Witte klaver onderzaaien kan ook een oplossing bieden. Afhankelijk van de voorkomende akkervogels in een gebied zijn andere zaadleverende gewassen aangewezen. Uw bedrijfsplanner zal dat met u bespreken.
- Gebruik onbehandeld zaaizaad, dus zonder een laagje met bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en dergelijke. U voorkomt zo dat akkervogels daarmee in contact komen. Dat is ook beter voor o.a. regenwormen en ander bodemleven.

## VERGOEDING

Voor een beheerovereenkomst faunavoedselgewas wisselteelt ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.053 euro per hectare.