

## ZAADMENGSELS VOOR BEHEEROVEREENKOMSTEN

### VOOR DE BEHEEROVEREENKOMSTEN FAUNARAND (PLUS), FAUNA-AKKER (PLUS), FAUNA-AKKER LUZERNE EN KRUIDENRIJKE AKKERRAND

#### Meerjarig graskruidenmengsel

- Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van uw beheerovereenkomst, of uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 11 kg/ha in van onderstaand mengsel.
- U kunt de grassen rood zwenkgras en veldbeemdgras vervangen door gewoon struisgras (4 kg/ha) en reukgras (2 kg/ha).
- \* Hebt u een beheerovereenkomst **faunarand (plus), de fauna-akker (plus), de fauna-akker luzerne en de kruidenrijke akkerrand gefaseerd maaien**? Voeg dan bijkomend 10 kg/ha gerst/haver/rogge/tarwe of een mengsel ervan toe. Gebruik daar onbehandeld zaaizaad voor.
- Voeg **geen bijkomende granen** toe aan de kruidenrijke akkerrand 15 juni en kruidenrijke akkerand 15 juli volledig maaien.
- U mag grote klaproos en korenbloem weglaten voor de kruidenrijke akkerrand 15 juni.

Nederlandse benaming	Wetenschappelijke benaming	11 kg/ha
rood zwenkgras	<i>Festuca rubra subsp. commutata</i>	4 kg/ha
veldbeemdgras	<i>Poa pratensis subsp. pratensis</i>	2 kg/ha
witte klaver (weide- of cultuurklaver)	<i>Trifolium repens</i>	0,5 kg/ha
luzerne	<i>Medicago sativa</i>	0,5 kg/ha
rode klaver (diploïde vorm)	<i>Trifolium pratense</i>	1 kg/ha
gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	1 kg/ha
voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	0,5 kg/ha
hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	0,5 kg/ha
<i>grote klaproos</i>	<i>Papaver rhoeas</i>	0,25 kg/ha
<i>korenbloem</i>	<i>Centaurea cyanus</i>	0,25 kg/ha
<i>gewone margriet</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0,125 kg/ha
<i>wilde peen</i>	<i>Daucus carota</i>	0,125 kg/ha
<i>smalle weegbree</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	0,25 kg/ha
<b>* gerst/haver/rogge/tarwe</b>		<b>+ 10 kg/ha</b>

- Hebt u bijkomende stroken?
  - Zaai voor een **optie bloemenstrook** een bloemenmengsel zoals vermeld onder 3 of 5 bij de beheerovereenkomst bloemenakker.

- Zaai voor een **optie korte strook** bovenstaand mengsel in of 10 kg/ha witte klaver (weide- of cultuurklaver) in.
- Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat in de tabel, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU.

## VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST AKKERRAND

- Zaai in de nazomer voor de start van de beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar een gras(kruiden)mengsel naar keuze in. Je kan hierover advies vragen aan uw bedrijfsplanner.

## VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST BLOEMENAKKER

Voor de beheerovereenkomst bloemenakker zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk samen met uw bedrijfsplanner welk type bloemenakker het meest geschikt is.

### 1. Meerjarig mengsel van vlinderbloemigen

- Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van de beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 18 kg/ha in van onderstaand mengsel.

Nederlandse benaming	Wetenschappelijke benaming	18 kg/ha
rode klaver (diploïde vorm)	<i>Trifolium pratense</i>	6 kg/ha
witte klaver (weide- of cultuurklaver)	<i>Trifolium repens</i>	4 kg/ha
gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	1,5 kg/ha
voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	3 kg/ha
luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3 kg/ha
<i>duizendblad</i>	<i>Achillea millefolium</i>	0,25 kg/ha
<i>wilde peen</i>	<i>Daucus carota</i>	0,25 kg/ha

- Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat in de tabel, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU.

## 2. Meerjarig mengsel functionele agrobiodiversiteit

- Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van de beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 16 kg/ha in van onderstaand mengsel.

Nederlandse benaming	Wetenschappelijke benaming	16 kg/ha
bonte wikke	<i>Vicia villosa</i>	1 kg/ha
voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	5 kg/ha
rode klaver (diploïde vorm)	<i>Trifolium pratense</i>	3 kg/ha
gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	1 kg/ha
venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	0,25 kg/ha
dille	<i>Anethum graveolens</i>	1 kg/ha
pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i>	1,25 kg/ha
gele ganzebloem	<i>Glebionis segetum</i>	0,75 kg/ha
goudsbloem	<i>Calendula officinalis</i>	1 kg/ha
bernagie	<i>Borago officinale</i>	0,5 kg/ha
<i>grote kaardebol</i>	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,125 kg/ha
<i>duizendblad</i>	<i>Achille millefolium</i>	0,125 kg/ha
<i>wilde peen</i>	<i>Daucus carota</i>	0,25 kg/ha
<i>gewone margriet</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0,25 kg/ha
<i>grote klaproos</i>	<i>Papaver rhoeas</i>	0,25 kg/ha
<i>korenbloem</i>	<i>Centaurea cyanus</i>	0,25 kg/ha

- Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) België, Nederland, Luxemburg, Noordwest Duitsland (Nedersaksen) en Noord-Frankrijk (Nord Pas-de-Calais, Picardië of Hoog Normandië).

## 3. Tweejarig bloemenmengsel

- Zaai voor 1 mei van het eerste jaar min. 7 kg/ha en max. 10 kg/ha (op lichtere gronden) in van onderstaand mengsel.
- Zaai daarna jaarlijks voor 1 mei de helft van de oppervlakte opnieuw in met dit mengsel. Wissel jaarlijks het deel dat u opnieuw inzaait.

Nederlandse benaming	wetenschappelijke benaming	7 kg/ha
rogge	<i>Secale multicaule</i>	0,7 kg/ha
triticale	<i>Triticale</i>	1,9 kg/ha
zomerhaver	<i>Avena sativa</i>	1 kg/ha
huttentut	<i>Camelina sativa</i>	0,49 kg/ha
zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	0,7 kg/ha
boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	0,28 kg/ha
mergstamkool	<i>Brassica oleracea</i>	0,28 kg/ha
bladrammenas	<i>Raphanus sativus</i>	0,21 kg/ha



venkel	<i>Foeniculum vulgare</i>	0,21 kg/ha
cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	0,1 kg/ha
luzerne	<i>Medicago sativa</i>	0,28 kg/ha
voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	0,035 kg/ha
gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	0,035 kg/ha
hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	0,1 kg/ha
rode klaver (diploïd)	<i>Trifolium pratense</i>	0,035 kg/ha
<i>grote kaardebol</i>	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,035 kg/ha
<i>duizendblad</i>	<i>Achillea millefolium</i>	0,035 kg/ha
<i>knoopkruid</i>	<i>Centaurea jacea</i>	0,14 kg/ha
<i>wilde peen</i>	<i>Daucus carota</i>	0,14 kg/ha
<i>gewone margriet</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i>	0,07 kg/ha
<i>korenbloem</i>	<i>Centaurea cyanus</i>	0,112 kg/ha
<i>grote klaproos</i>	<i>Papaver rhoeas</i>	0,112 kg/ha

- Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU.

#### 4. Tweejarig bloemenmengsel zomertortel

- Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van de beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 9 kg/ha in van onderstaand mengsel.
- Zaai daarna jaarlijks in de nazomer de helft van de oppervlakte opnieuw in met dat mengsel. Wissel jaarlijks het deel dat u opnieuw inzaait. Het andere deel bewerkt u in het najaar oppervlakkig.

<b>Nederlandse benaming</b>	<b>Wetenschappelijke benaming</b>	<b>9 kg/ha</b>
voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	2 kg/ha
gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	2 kg/ha
huttentut	<i>Camelina sativa</i>	0,5 kg/ha
witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	0,425 kg/ha
kleine klaver	<i>Trifolium dubium</i>	0,250 kg/ha
boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	0,45 kg/ha
winterpostelein	<i>Claytonia perfoliata</i>	0,125 kg/ha
hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	2 kg/ha
rode klaver	<i>Trifolium pratense subsp?</i>	1 kg/ha
<i>gewone duivenkervel</i>	<i>Fumaria officinalis</i>	0,25 kg/ha

- Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU.

## 5. Eénjarig bloemenmengsel

- Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van de beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei in het eerste jaar 10 kg/ha in van onderstaand mengsel.
- Zaai daarna jaarlijks in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) opnieuw in met dit mengsel.
- Zaai minstens de helft van de oppervlakte opnieuw in en wissel jaarlijks het deel dat u opnieuw inzaait indien u bij voldoende hergroei niet de volledige oppervlakte opnieuw inzaait.

Nederlandse benaming	Wetenschappelijke benaming	10 kg/ha
<i>korenbloem</i>	<i>Centaurea cyanus</i>	1,5 kg/ha
<i>grote klaproos</i>	<i>Papaver rhoeas</i>	1,5 kg/ha
<i>echte kamille</i>	<i>Matricaria chamomilla</i>	0,5 kg/ha
dille	<i>Anethum graveolens</i>	0,5 kg/ha
Kruisbloemigen (minstens 2 waaronder zwarte mosterd)		3 kg/ha
koolzaad	<i>Brassica napus</i>	
raapzaad	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	
zwarte mosterd	<i>Brassica nigra</i>	
Vlinderbloemigen (minstens 3)		3 kg/ha
luzerne	<i>Medicago sativa</i>	
voederwikke	<i>Vicia sativa</i>	
bonte wikke	<i>Vicia villosa</i>	
rode klaver (diploid)	<i>Trifolium pratense</i>	

- Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU.

## VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST FAUNAVOEDSELGEWAS EN FAUNA-AKKER (PLUS)

### Zaadleverend gewas

- Zaai jaarlijks minstens 160 kg/ha bij voorkeur onbehandeld zaad in van tarwe, -gerst of -haver, rogge of een mengsel ervan.
- U kunt er ook voor kiezen, dit wordt bij faunavoedselgewas wisselteelt sterk aanbevolen, om slechts 100 kg/ha van deze granen in te zaaien in combinatie met:
  - ofwel 5kg/ha witte klaver
  - ofwel 8 kg/ha rode klaver
  - ofwel 25 kg/ha voederwikke
  - ofwel een combinatie van witte- en rode klaver en voederwikke (in lagere hoeveelheden)
- Zaai bij hoge onkruiddruk éénmalig in het eerste of het derde jaar van de beheerovereenkomst een mengsel met vlinderbloemigen in bvb. grasklaver. Vraag daarover advies aan uw bedrijfsplanner.



- In functie van specifieke doelsoorten kunnen nog andere componenten bvb. zonnebloemen, boekweit toegevoegd worden, uw bedrijfsplanner zal u daarover inlichten.

## VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST FAUNA-AKKER LUZERNE EN LUZERNEHOOILAND

### **Luzerne(mengsel)**

- Zaai in de nazomer (voor 15 september) 25 kg/ha luzerne met 5 kg/ha rode klaver in.
- U kunt er ook voor kiezen om een mengsel van 30 kg/ha in te zaaien:
  - 15 tot 25 kg/ha luzerne met 5kg/ha rode klaver
  - met 0 tot 10 kg/ha (ten koste van het aandeel luzerne) rood zwenkgras en/of veldbeemdgras en rode klaver, voederwikke of bonte wikke
- In functie van specifieke doelsoorten kan ook 10kg/ha winter/zomergerst, rogge of haver toegevoegd worden, uw bedrijfsplanner zal u daarover inlichten.

## VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST BOTANISCH GRASLAND ONTWIKKELEN RAAIGRAS

- Zaai Italiaans raaigras in in reguliere dichtheid. Zaai daarbij de twee- of driejarige variëteit in. Op zeer lichte voedselarme grond kan ook de éénjarige variëteit ingezaaid worden. Engels raaigras is niet toegelaten.
- In functie van specifieke doelsoorten kunnen nog andere componenten toegelaten worden, uw bedrijfsplanner zal u daarover inlichten.

## FACTUUR

- Hou de factuur of het aankoopbewijs en het zaaizaadetiket van het ingezaaide mengsel bij tot drie jaar na afloop van de beheerovereenkomst. Voor de inzaai van granen bij een faunarand (plus), de fauna-akker (plus), de fauna-akker luzerne, faunavoedselgewas en de kruidenrijke akkerrand gefaseerd maaien moet u geen factuur of aankoopbewijs bijhouden en mag u eigen geogste granen inzaaien.

## TIPS

- Inzaaien gebeurt best in de nazomer (voorafgaand aan de start van de beheerovereenkomst) of uiterlijk rond half april.
- Als u inzaait in het voorjaar en/of op percelen met een grotere onkruiddruk, werk dan bij voorkeur met een vals zaaibed. Daarbij maakt u de strook minstens twee weken voor de inzaai van het mengsel zaaiklaar. U zaait dan in nadat u de bodem oppervlakkig bewerkt hebt (3 à 4 centimeter). Die oppervlakkige bodembewerking bestrijdt het aanwezige of kiemende onkruid zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen.

- Het zaaien zelf moet zo oppervlakkig mogelijk gebeuren.
- Als u grotere oppervlaktes inzaait, roer het zaadmengsel dan af en toe om ontmenging van de zaden te voorkomen.
- Als u inzaait in droge omstandigheden of op lichte gronden, wordt na het inzaaien best gerold om uitdroging van de oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen.

