



FAUNA-AKKER WISSELTEELT

infofiche beheerovereenkomsten

WAT?

Een fauna-akker wisselteelt is een perceel dat voor een deel uit stroken faunavoedselgewassen wisselteelt en een deel uit stroken faunaranden bestaat. Het faunavoedselgewas wisselteelt zaait u in met een graange- was of andere zaadleverende gewassen, die u niet oogst. Na het eerste jaar zaait u de helft van het faunavoedselgewas beurtelings opnieuw in. Faunaranden zijn stroken die u inzaait met een mengsel van kruiden en grassen.

WAAROM?

- Door het aangepaste maaibeheer op fauna-akker wisselteelt kunnen grond- broedende akkervogels zoals veld- leeuwerik en grauwe gors hun jongen veilig groot brengen
- Akkervogels vinden zowel in de winter als in de zomer voedsel op de fauna-akker wisselteelt. Daarmee stijgen de overle- vingskansen van akkervogels, kunnen ze fitter het nieuwe broedseizoen starten en vinden ze voedsel voor hun jongen.
- Muizen schuilen en vinden voedsel in de fauna-akker. Die muizen dienen als voed- sel voor roofvogels en uilen.



HOE?



Leg een perceel aan met afwisselend stroken faunavoedselgewas en faunaranden.
Elk deel neemt minstens 40% in.

Er zijn 2 opties voor faunavoedselgewas wisselteelt



Deel het perceel op in 2 gelijke delen of in stroken van minimaal 15m breed.



Zaai **jaarlijks** de helft van de oppervlakte opnieuw in.




Laat het gewas tot volgende inzaai staan.


1 zomergraan



zaai zodra het weer het toelaat, en uiterlijk voor 1 mei



2 wintergraan



TIPS

1 Een vals zaaibed aanleggen, helpt onkruiden onderdrukken. Een twee- tot drietal weken na het zaaiklaar leggen van het perceel kan u, in het geval onkruiden kiemen, het perceel oppervlakkig bewerken. Witte klaver onderzaaien kan ook een oplossing bieden. Afhankelijk van de voorkomende akkervogels in een gebied zijn andere zaadleverende gewassen aangewezen. Uw bedrijfsplanner zal dat met u bespreken.

2 Gebruik onbehandeld zaaizaad, dus zonder een laagje met bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en dergelijke. U voorkomt zo dat akkervogels daarmee in contact komen. Dat is ook beter voor o.a. regenwormen en ander bodemleven.

Faunaranden




Breedte rand tussen 9 en 30 meter.



Zaai in met graskruidmengsel, bij voorkeur in het najaar voor de start van uw overeenkomst en uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar.



Bewaar aankoopbewijs en zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop beheerovereenkomst



Fauna-akker wisselteelt

€ 2248 euro/ha/jaar

Fauna-akker wisselteelt plus

€ 2349 euro/ha/jaar

! Hou rekening met volgende bepalingen:



U mag bemesten volgens de bemestingnormen.



- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen.
- Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal ongewenste soorten mag wel.



Voer geen andere activiteiten uit op het perceel.

Lees welke zaadmengsels u moet gebruiken ook op vlm.be